

1. KOL	Sant	Falskt	Vet inte
a) Ordet "kroniskt" i KOL står för "allvarlig"		✓	
b) Vid KOL är syrehalterna i blodet alltid låga		✓	
c) Ett lungfunktionstest (spirometri) behövs för att diagnosticera KOL	✓		
d) KOL förvärras vanligen över tid	✓		
e) KOL är ovanligt hos personer under 40 år	✓		

2. KOL	Sant	Falskt	Vet inte
a) Mer än 70 % av KOL-fallen orsakas av cigarettrökning	✓		
b) KOL kan orsakas av yrkesrelaterad damm exponering	✓		
c) Långvarig astma kan utvecklas till KOL	✓		
d) KOL är vanligtvis en ärftlig sjukdom		✓	
e) Kvinnor är mindre känsliga för cigarettrökens skadeverkningar än män		✓	

3. Rökning vid KOL	Sant	Falskt	Vet inte
a) Att sluta röka minskar risken för hjärtsjukdomar	✓		
b) Att sluta röka bromsar hastigheten på lungfunktionsnedsättningen	✓		
c) Det är ingen idé att sluta röka då skadan är redan skedd		✓	
d) Att sluta röka leder ofta till förbättrad lungfunktion		✓	
e) För att få nikotinersättningsmedel måste man ha recept		✓	

4. Diagnostik vid KOL	Sant	Falskt	Vet inte
a) För att få diagnosen KOL krävs det att kvoten mellan FEV1/FVC skall vara under 0,5		✓	
b) För att ställa diagnosen KOL räcker det med att fråga efter symtom och rökning		✓	
c) För att ställa diagnosen KOL räcker det med att göra en spirometri efter luftrörsvidgande medicin.	✓		
d) Man kan inte få diagnosen KOL om man inte rökt		✓	
e) Vid KOL blir man mer andfådd än vanligt vid fysisk aktivitet	✓		



5. Astma/KOL	Sant	Falskt	Vet inte
a) Vid KOL har man normal lungfunktion i perioder		✓	
b) Det är vanligast med en plötslig debut av KOL		✓	
c) Om man har hosta vid KOL är det vanligast med besvär på morgonen	✓		
d) Vid astma hjälper inte luftrörsvidgande medicin		✓	
e) Det är ovanligt med astma under 40 års ålder		✓	